

CRESOPHENE

Инструкция по применению

Состав:

Дексаметазона ацетат	0,111 г
Тимол	5,000 г
Парахлорфенол	30,000 г
Камфора рацемическая	64, 889 г

на 100 г раствора

Лекарственная форма:

Раствор для стоматологического использования

Показания:

Антисептическая обработка корневых каналов перед их пломбированием

Дозировка и способ применения:

Строго местное применение

После удаления гнилых масс и тщательной инструментальной обработки поместить внутрь канала турунду, смоченную раствором и хорошо отжатую во избежание внесения лишних количеств препарата.

Запломбировать временным цементом герметично и без давления

Оставить от 3 до 5 дней

При необходимости повторить процедуру после удаления содержимого каналов и их инструментальной обработки классическими методами.

Противопоказания:

Дети в возрасте до двух с половиной лет

Аллергия на один из компонентов состава, в частности, на кортикостероиды и фенолы

Меры предосторожности:

В случае контакта со слизистой промыть водой

Не глотать

Пропитывать ватный шарик без избытка

Не оставлять на обнаженной пульпе

Нежелательные реакции

Риск аллергии

Передозировка:

В случае передозировки или неправильного использования фенолы способны вызвать воспаление периапикальных тканей

Фармакодинамика:

Профессиональный стоматологический препарат

А: органы пищеварения и метаболизм

Дексаметазон: противовоспалительное, кортикостероид

Тимол: антисептик

Срок годности:

3 года

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C

Форма выпуска:

Флакон 13 мл

После первого использования заменить алюминиевую капсулу пробкой-аппликатором, которая находится в коробке с препаратом.