

Fluocal gel

Инструкция по применению

Качественный и количественный состав:

Фтористый натрий 2,71 г
Экципиенты: фосфорная кислота, сахарин, спирт,
Ксантановая смола, очищенная вода.
100 мл содержат 1,23 г активного фтора.

Лекарственная форма:

Гель для нанесения на поверхность зуба – флакон 125 мл.

Применение (терапевтические показания):

Профилактика кариеса, особенно у пациентов с высоким риском развития кариеса

Внимание!

Запрещается применение в следующих случаях (противопоказания):

- повышенная чувствительность к компонентам Fluocal gel
- лечение детей вследствие высокого содержания фтора, наличия спирта и способа применения

Меры предосторожности:

Не глотать.

Лекарственное взаимодействие и другие взаимодействия:

- кальциевые соли

Для предотвращения потенциального взаимодействия между различными лекарственными препаратами, следует предоставить стоматологу информацию о любом курсе лечения, которое Вам назначено.

Беременность и период лактации

Как правило, рекомендуется консультироваться с Вашим стоматологом до принятия каких-либо лекарственных средств во время беременности в период кормления грудью.

Список эксципиентов, сведения о которых необходимы при лечении определенных пациентов: содержание этилового спирта 95%.

Дозировка и способ применения:

Только для местного применения в полости рта

Высокое содержание фторид ионов.

Только для взрослых!

Удалите зубной камень.

Изолируйте зубы с помощью ватных валиков. Просушите зубы теплым воздухом, уделяя внимание, в частности, окклюзионным и аппроксимальным поверхностям. Fluocal gel наносится на поверхность всех зубов. Гель должен находиться в контакте с поверхностью зубов в течение 4 минут. После обработки следует попросить пациента сплюнуть излишки геля и рекомендовать ему не есть, не пить и не полоскать рот в течение, по крайней мере, 30 минут после проведения лечения.

Частота и периодичность приема:

При лечении взрослых, в случае слабого развития кариеса, достаточно проводить лечение препаратом один раз в год. Пациенты с высокой кариесвосприимчивостью должны проходить лечение каждые шесть месяцев.

Передозировка:

В случае проглатывания большого количества геля следует обратиться к врачу.

Случайное проглатывание большого количества Fluocal gel может вызвать тошноту и рвоту.

Хранение:

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.