

Fluocalsolution

Инструкция по применению

Состав:

Фтористый натрий 1,00 г
Наполнитель q.s. ad 100 мл

Свойства:

Профилактическое действие фтористых соединений при кариесе хорошо показано во многих последних научных работах, фторид натрия, по меньшей мере, так же активен, как фтористые соединения тяжелых металлов (например, олова). FLUOCAL, который вобрал в себя специфические свойства фтористых соединений, действует двойным образом:

1. Его бактериостатическое действие ингибирует действие микробной флоры, покрывающей коронку зуба, пелликулу.

Это действие препарата является особенно важным, когда речь идет о бактериях молочнокислой группы, так как они, являясь производителем кислот, представляют особую опасность.

2. Этот процесс усиливается вдвойне за счет действия фтора на эмаль, вызывая изменение ее кристаллической структуры и значительно увеличивая ее стойкость к химическому воздействию. Это второе действие одинаково эффективно и при обнажении дентина и цемента.

Показания:

Профилактика кариеса зубов.
Лечение гиперестезии зубов.

Способ применения:

1. Профилактика кариеса зубов. Тщательно удалите зубной камень. Изолируйте зубы ватными тампонами. Просушите струей теплого воздуха обрабатываемые поверхности. В течение семи - восьми минут прикладывайте к обрабатываемым участкам узкий бинтик, смоченный во FLUOCAL.

Не менее чем на 3 минуты оставить бинтик на месте, удерживая его ватными тампонами. В зубные фиссуры FLUOCAL вводится с помощью зонда.

Закончив процедуру, удалите тампоны, предложите пациенту тщательно, несколько раз прополоскать рот. Каждые три месяца повторяйте этот курс лечения.

2. Повышенная чувствительность зубов. Просушить обрабатываемый зуб, предварительно изолировав его от попадания слюны. Ватный тампон смочить во FLUOCAL и прикладывать к чувствительному участку в течение минуты. Предложить пациенту прополоскать рот. Всю процедуру повторить два-три раза.

Примечание:

Во время хранения препарата может образоваться небольшой осадок, который не наносит вред качеству препарата.

Высокая концентрация фторида позволяет проводить лечение быстро, в течение 3 минут. Жидкий состав позволяет отказаться от использования ложки.

Форма выпуска:

Флакон – 13 мл.