

Septomixine
Инструкция по применению

Состав:

Гидрокортизона ацетат	28,60 г
Фрамицетина сульфат	19,00 М/УИ
Количество, соответствующее титру 700 УИ/мг	
Экципиенты: пропиленгликоль, глицерин	

Лекарственная форма:

Паста для дентального использования.

Показания:

Антисептическая обработка корневых каналов перед пломбированием.

Способ применения:

Строго местное применение.

- Перед использованием препарата рекомендуется очистить каналы и удалить возможные остатки некротизированной пульпы.
- Высушить канал и заполнить его пастой с помощью каналонаполнителя.
- Оставить препарат в канале на срок не менее 3 дней, затем канал вновь очищается и пломбируется классической пастой.

Противопоказания:

Аллергия на фрамицетин или кортикостероиды.

Предостережения и особые меры предосторожности:

Не провоцировать систематического выхода материала за верхушку.

Нежелательные реакции:

Риск аллергии.

Передозировка:

При нормальных условиях применения в стоматологии эффекта передозировки отмечено не было.

Ацетат гидрокортизона: глюкокортикоид, противовоспалительное.

Сульфат фрамицетина: антибиотик группы аминогликозидов.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C.

Форма выпуска:

Тюбик 7,5 г

