3M ESPE

Single Bond Universal

(en) Adhesive
(ru) Адгезив
(bg) Адхезив
(hr) Adhezivni
(hu) Ragasztóanyag
(pl) Klej
(ro) Adeziv

Instructions for Use
Инструкция по применению
Указания за употреба
Upute za upotrebu

Felhasználási tudnivalók
Instrukcja użycia
Instrucțiuni de utilizare

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss – Germany

3M ESPE
Dental Products
St.Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

3M, ESPE, Clinpro and RelyX are trademarks of 3M Company or 3M Deutschland GmbH.
Used under license in Canada. © 2011, 3M All rights reserved.

CE 0123

44000763977/01

(en) ENGLISH

Product Description
Single Bond Universal is a single-component, light-curing adhesive which is available in L-Pop blisters for single dosing or in bottles for multiple doses.

Depending on the indication, the adhesive is used:
– In a "self-etching" procedure to enable the shortest possible treatment time and to minimize post-operative sensitivities.
– With selective enamel etching to maximize the adhesion to the tooth enamel and to minimize post-operative sensitivities.
– In a "total etching" procedure with a prior phosphoric acid etching step, e.g., if the etching cannot be restricted to the tooth enamel.

Single Bond Universal DCA activates the dual curing mechanism of Single Bond Universal and is mixed with the adhesive whenever dual-cure or self-cure composite filling materials, cements, or core build-up materials are being used. The addition of the activator to the adhesive is not required when using RelyX™ Ultimate Adhesive Resin Cement because the activator is already integrated into the cement.

☞ The instructions for Use must be kept for reference for the duration of product use. Please see the pertinent information for use for details on all of the products mentioned below.

Indications
- All classes of fillings (according to Black) with light-curing composite or compomer filling materials
- Cementation of indirect restorations when combined with RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement
- Cementation of veneers when combined with RelyX Veneer Cement
- Bonding of core build-ups made of light-curing composite or core build-up materials
- Bonding of dual-cure cements and core build-up materials and self-cure composites when combined with Single Bond Universal DCA
- Repair of composite or compomer fillings
- Intraoral repair of composite restorations, porcelain fused to metal, and all-ceramic restorations without extra primer
- Root surface desensitization
- Sealing of cavities prior to cementation of amalgam restorations
- Sealing of cavities and prepared tooth stumps prior to temporary cementation of indirect restorations
- Bonding of fissure sealants
- Protection of teeth for glass ionomer fillings

Precautionary Measures

For Patients and Dental Personnel
- Single Bond Universal: contact with eyes may cause severe eye damage. Wear eye protection to prevent injury. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

For Patients
- Single Bond Universal contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate allergies.
- If prolonged contact with oral tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use.

For Dental Personnel
- Single Bond Universal contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these substances. Avoid direct skin exposure to uncured adhesive. If skin contact occurs, wash skin with soap and water.
- The use of protective gloves and a no-touch technique is recommended. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If Single Bond Universal contacts the glove, remove and discard the gloves. Wash your hands immediately with soap and water and re-glove.
- If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.
- Single Bond Universal and Single Bond Universal DCA are highly flammable. Avoid static electricity build-up. Keep away from heat, sparks, open flame, pilot lights, and other ignition sources.

3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com, or contact your local subsidiary.

Precautions during Processing
- Seal temporary restorations using a eugenol-free product (e.g., with RelyX™ Temp NE). The use of temporary cements containing eugenol can inhibit the polymerization process of Single Bond Universal during the final cementation.
- For the best possible bond, do not treat the surface of Zirconia, aluminum oxide, or metal restorations with phosphoric acid.

Pulp Protection
To avoid pulpal irritation, cover areas in close proximity to the pulp by applying small amounts of hard-setting calcium hydroxide material. To avoid bite increases during the cementing of the later restoration, the pulp protection should be applied prior to taking an impression for the final restoration.

Tooth Preparation

Preparation of the Cavity/Tooth Stump
- Remove loose preparation debris by spraying with water, and lightly air dry the stump or the cavity in only 2–3 bursts of water-free and oil-free air, or use cotton pellets to dry it off. Do not overdry.
  – The cavity should be just dry enough that the surface has a slightly glossy appearance. Overdrying can lead to post-operative sensitivity.

We advise against the use of substances such as desensitizers, disinfectants, astringents, dentin sealers, rinsing solutions containing EDTA, hydrogen peroxide, etc. (with the exception of chlorhexidine solutions) after the final cleaning. The residues of these substances can be detrimental to the bonding strength and sealing function of the adhesive, and especially of dual- and self-cure materials.

Unprepared Tooth Enamel
- Clean the tooth enamel as usual (e.g., with polishing paste or powder blasting), and thoroughly rinse by spraying with water.
- Then etch and rinse, see section "Selective Enamel Etching".
- Continue with the application of Single Bond Universal Adhesive.

Etching of the Tooth Structure (optional)
Clinically sufficient adhesive bonds are achieved by the application of the adhesive. Even higher adhesive values can be achieved by selectively etching the enamel or using the "total etching procedure".

Selective Enamel Etching
Accidental etching of the dentin does not have any detrimental effect on the adhesion.
- Apply a commonly used phosphoric acid etching gel (about 35%), e.g., Scotchbond™ Universal Etchant to the prepared and unprepared (if present) tooth enamel and allow to react for 15 sec.
- Rinse thoroughly with water and dry with water-free and oil-free air or with cotton pellets; do not overdry.

Total Etching Procedure
- Apply a commonly used phosphoric acid etching gel (about 35%), e.g., Scotchbond Universal Etchant, to the prepared and unprepared (if present) tooth structure (enamel and dentin) and allow to react for 15 sec.
- Rinse thoroughly with water and dry with water-free and oil-free air or with cotton pellets; do not overdry.

Root Surface Desensitization
- Clean the root surface as usual (e.g., with polishing paste or powder blasting).
- Clean thoroughly by spraying with water, and dry with water-free and oil-free air or with cotton pellets.
- Continue with the application of Single Bond Universal Adhesive.

Pre-treatment of Fillings or Restorations During Repair
(made of composite, glass ceramic, Zirconia ceramic, aluminum oxide ceramic, metal (incl. amalgam))
- Thoroughly roughen the surface of the restoration which is to be luted, preferably by blasting with aluminum oxide ≤40 µm; if ceramic, remove the glaze up to 1 mm over the margin.
- Clean thoroughly by spraying with water, and dry with water-free and oil-free air or with cotton pellets.
  – Do not etch with phosphoric acid because this can weaken the adhesion to certain materials (e.g., Zirconia, aluminum oxide, metal).
- Continue immediately with the application of Single Bond Universal Adhesive. The use of an additional primer is unnecessary.

Dosing Adhesive

Dosing from the Bottle
The dosing bottle cap has a thumb depression so that it can be opened to one side and closed again with one hand. The cap will remain open if the opening angle is >90°.
- To open, take the bottle in your hand, place your thumb in the thumb depression, and push the cap to the side until it remains in the open position.
- Hold the bottle upside down in a vertical position and pour the required quantity of Single Bond Universal in a mixing well. Protect the adhesive in the mixing well from light.
- After use, carefully close the bottle again by applying pressure to the lever from above.
  – The cap tangibly snaps into place when pressed closed and a small, even gap between the cap and bottle can be seen all the way around.

Dosing from the L-Pop Blister
Attention! Do not squeeze the L-Pop blister without the disposable applicator.
- Hold the shaft of the disposable applicator with one hand, covering the blister opening with your thumb. This will prevent the eluting liquid from spraying out.
- With the thumb and index finger of the other hand, squeeze the reservoir of the L-Pop blister, starting with the outer end, in the direction of the disposable applicator.
- Turn the disposable applicator back and forth in the liquid to cover it completely.
- For easy application in the cavity, the disposable applicator can be bent while it is still in the L-Pop blister. In order to do this, only put the disposable applicator out of the blister far enough so that the metal base section of the applicator shaft can be seen. Fold the applicator shaft at this location over your thumbnail.
- During the treatment, press all of the liquid into the open depression end with your thumb and index finger to rewet the applicator.

Dosing Activator
- Unscrew the lid of the bottle.
- Mix the required quantity of Single Bond Universal DCA in a ratio of 1-to-1 (drops) with Single Bond Universal in a mixing well and mix for 5 sec immediately before application. Protect the liquid in the mixing well from light.
- Carefully close the bottle tightly after dosing. If necessary, disinfect the bottle in accordance with local hygiene regulations.

Application
- Avoid any contamination with blood, saliva, or sulcus fluid during application. We recommend the use of a rubber dam to ensure that the treated area is kept sufficiently dry and to prevent exposure of any soft tissue.

Procedure for direct restorations with light-curing composites and compomers, intraoral repair using light-curing composites, root surface desensitization, sealing of cavities before filling with amalgam, sealing of cavities and stump preparations before temporary attachment of indirect restorations
- Use the disposable applicator to apply the adhesive to the entire tooth structure and **rub it in** for 20 sec. Avoid contact between the adhesive and the oral mucosa.
- If necessary, rewet the dissipable applicator during treatment.
- Subsequently direct a gentle stream of air over the liquid for about 5 sec until it no longer moves and the solvent has evaporated completely.
- Harden the adhesive with a commonly used curing light for 10 sec.
- As appropriate for the indication, continue with the desired material in accordance with the pertinent instructions for use.

Procedure for dual-cure and self-cure composite and core build-up materials and cements
When using RelyX Ultimate, the activator is not required because it has been integrated into the cement. Please follow the RelyX Ultimate instructions for use.
- Mix the required quantity of Single Bond Universal and Single Bond Universal DCA in a mixing well and mix for 5 sec.
- Use the disposable applicator to apply the mixture to the entire tooth structure and **rub it in** for 20 sec. Avoid contact between the adhesive and the oral mucosa.
- If necessary, rewet the dissipable applicator during treatment.
- Subsequently direct a gentle stream of air over the liquid for about 5 sec until it no longer moves and the solvent has evaporated completely.
- Harden the adhesive with a commonly used curing light for 10 sec.
- As appropriate for the indication, continue with the desired material in accordance with the pertinent instructions for use.

Procedure when cementing indirect restorations and veneers using RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement
- When using RelyX Ultimate, Single Bond Universal DCA is not required. Please follow the RelyX Ultimate instructions for use.

Use of Single Bond Universal as a primer for indirect restorations
When using RelyX Ultimate, Single Bond Universal DCA is not required. Please follow the RelyX Ultimate instructions for use.
- Prepare the surface of the restoration:
  – Etch glass ceramic surfaces with hydrofluoric acid in accordance with manufacturer's instructions.
  – Roughen composite, Zirconia ceramic, and metal surfaces, preferably by sandblasting.
  – Do not etch with phosphoric acid because this can weaken the bonding to certain materials (e.g., Zirconia, aluminum oxide, metal).
- Thoroughly rinse the surface with water and dry with water-free and oil-free air or with cotton pellets.
- In combination with other composite cements:
  – Place one drop each of Single Bond Universal and Single Bond Universal DCA in a mixing well and mix for 5 sec.
  – Immediately after mixing, use the disposable applicator to apply the adhesive to the entire surface to be cemented and distribute it evenly.
  – Avoid contact between the adhesive and the oral mucosa. If necessary, rewet the disposable applicator during treatment. Subsequently direct a gentle stream of air over the liquid for about 5 sec until it no longer moves and the solvent has evaporated completely. **Do not light-cure.**
  – Rinse thoroughly with water and dry with water-free and oil-free air or with cotton pellets; do not overdry.
- Use the disposable applicator to apply Single Bond Universal to the etched veneer. Subsequently direct a gentle stream of air over the liquid for about 5 sec until it no longer moves and the solvent has evaporated completely. **Do not light-cure.**
- Carefully cement the veneer with RelyX™ Veneer Cement following the pertinent instructions for use. Remove any excess from the veneer edges and light-cure in accordance with manufacturer's instructions. We recommend light-curing the gingival edges first, then the middle and the incisal edges. Avoid eye contact with the light source.

Procedure for light-cure sealing of fissures
In contrast to Single Bonde Universal, light-cure fissure sealants can be bonded to untreated tooth enamel using Single Bond Universal without prior etching with phosphoric acid.
- Clean the surface to be sealed with polishing paste or by powder blasting (e.g., using Clinpro Prophy Powder).
- Use the disposable applicator to apply Single Bond Universal to the surface to be sealed and **rub it in** for 20 sec, applying pressure. Continue to rub in for a longer period of time when sealing larger surfaces. **Do not reduce this time.** Applying and distributing the adhesive is not adequate.
- Subsequently direct a gentle stream of air over the liquid for about 5 sec until it no longer moves and the solvent has evaporated completely.
- Apply a light-cure fissure sealant, e.g., Clinpro Sealant.
- Polymerize the fissure sealant and the adhesive together with a commonly available light-curing device; the time is dependent on the fissure sealant used.

Use as protective varnish for glass ionomer fillings
- If a template is used, first shape the filling, first remove the template.
- Use the disposable applicator to apply Single Bond Universal to the fully modeled filling and **rub it in** for 20 sec. Avoid contact between the adhesive and the oral mucosa.
- If necessary, rewet the disposable applicator during treatment.
- Subsequently direct a gentle stream of air over the liquid for about 5 sec until it no longer moves and the solvent has evaporated completely.
- Use a commonly available light-curing device to polymerize the adhesive for 10 sec on every surface of the filling.
- When the filling has been completely cured, grind down the occlusion and reapply the adhesive to the ground places to protect the filling from drying out.
- Use a damp cloth or cotton pellet to remove the oxygen inhibition layer.

Hygiene and Disinfection
Clean and contaminated adhesive and activator bottles with commonly used agents and disinfect them in accordance with the commonly used hygienic regulations.

Notes
Single Bond Universal can prematurely polymerize when exposed to natural or artificial lighting. Avoid intensive light exposure during application.

Storage and Stability
Store Single Bond Universal and Single Bond Universal DCA at 02–25°C/ 36–77°F.
Do not use after the expiration date.

Customer Information
No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty
3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

Information valid as of November 2011

(ru) РУССКИЙ

Описание продукта
Single Bond Universal является однокомпонентным, светоотверждаемым адгезивом, поставляемым в блистерах L-Pop для однократного нанесения или флаконах для многократных нанесений.

В зависимости от показаний адгезив используется:
– В технике «самопротравливания» для обеспечения минимально возможного времени протравливания и сведения к минимуму постоперативной чувствительности.
– Для селективного протравливания эмали для усиления адгезии к зубной эмали и сведения к минимуму постоперативной чувствительности.
– В технике «тотального протравливания» с предварительным этапом протравливания фосфорной кислотой (например, если протравливание невозможно ограничить зубной эмалью).

Single Bond Universal DCA активизирует механизм двойного отверждения Single Bond Universal и смешивается с с адгезивом вне зависимости от того, используются ли композитные пломбировочные материалы двойного отверждения или самоотверждающиеся композитные пломбировочные материалы, цементы или материалы для надстройки культи.
Добавления активатора к адгезиву не требуется в случае использования адгезивного полимерного цемента RelyX™ Ultimate Adhesive Resin Cement, так как активатор уже присутствует в цементе.

☞ Данную инструкцию по применению следует хранить на протяжении всего периода использования продукта. В отношении всех упомянутых ниже продуктов см. соответствующую информацию по применению.

Применение
- Все классы полостей (по Блэку) со светоотверждаемыми композитными или компомерными пломбировочными материалами
- Цементирование непрямых реставраций в сочетании с адгезивным полимерным цементом RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement
- Цементирование виниров в случае сочетания с цементом для виниров RelyX Veneer Cement
- Восстановление культи из светоотверждаемых композитных материалов или материалов для восстановления культи
- Связывание цементов двойного отверждения, материалов для восстановления культи и самоотверждающихся композитов химического отверждения в сочетании с Single Bond Universal DCA
- Починка реставраций из композитных или компомерных пломбировочных материалов
- Интраоральная починка композитных реставраций, металлокерамических конструкций и цельнокерамических реставраций без использования дополнительного праймера
- Десенсибилизация поверхности корня
- Силанизация полостей перед постоянной пломбой из амальгамы
- Силанизация полостей и культей зуба перед временным цементированием непрямых реставраций
- Бондинг фиссурных герметиков
- Защитное покрытие для стеклономерных пломбировочных материалов

Меры предосторожности

Для пациентов и стоматологического персонала
- Single Bond Universal: попадание в глаза может вызвать их серьезное повреждение. Во избежание травм рекомендуется носить защитные очки. В случае попадания в глаза следует незамедлительно промыть их обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Для пациентов
- В Single Bond Universal содержатся вещества, способные вызывать у отдельных людей при попадании на кожу аллергические реакции. Избегать использования данного продукта у пациентов, имеющих аллергию на акрилаты.
- В случае длительного контакта с тканями ротовой полости промыть обильным количеством воды. В случае аллергической реакции, по необходимости, обратиться к врачу, удалить продукт, если это необходимо, и прекратить последующее применение.

Для стоматологического персонала
- В Single Bond Universal содержатся вещества, способные вызывать у отдельных людей при попадании на кожу аллергические реакции. Для снижения риска аллергии сведите к минимуму контакт с этими материалами. В частности, избегайте контакта с неполимеризованным адгезивом. В случае попадания на кожу следует промыть ее мыльной водой.
- Рекомендуется использовать защитные перчатки и бесконтактную технику. Акрилаты могут проникать сквозь обычно используемые перчатки. В случае попадания Single Bond Universal на перчатки следует снять их и выбросить в мусор. Затем необходимо незамедлительно вымыть руки мыльной водой и надеть другие перчатки.
- В случае аллергии, по необходимости, следует обратиться к врачу.
- Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA легковоспламеняющиеся. Следует избегать накопления статического электричества. Хранить подальше от источников тепла, искр, открытого огня, запального пламени и прочих источников возгорания.

Действующие информационные листы по мерам безопасности компании 3M доступны на www.mmm.com или в вашем региональном филиале.

Меры предосторожности во время работы
- Зафиксируйте временные реставрации с использованием не содержащего эвгенола продуктов (например, с помощью RelyX™ Temp NE). Использование содержащих эвгенол временных цементов может препятствовать процессу полимеризации Single Bond Universal в ходе окончательной цементировки.
- Для достижения оптимальной адгезии не рекомендуется обрабатывать поверхность реставраций из диоксида циркония, оксида алюминия или металла фосфорной кислотой.

Защита пульпы
Во избежание раздражения пульпы, наложите на области, находящиеся в непосредственной близости от пульпы небольшое количество сильно схватывающего гидроксида кальция. Во избежание завышения прикуса во время окончательной постоянной реставрации защиту пульпы необходимо использовать до снятия оттиска под окончательную реставрацию.

Подготовка зуба

Подготовка полости/культи зуба
- Удалите остатки препарирования, образовавшиеся после препарирования при помощи воды и немного просушите не содержащим воды и масла воздухом культю или воспользуйтесь для сушки ватными тампонами. Не пересушивайте.
  – Полость должна быть высушена лишь до такой степени, чтобы поверхность имела слегка глянцевый внешний вид.
  – Перепросушивание может привести к возникновению постоперативной чувствительности.

После окончательной очистки полости мы не рекомендуем использовать такие вещества как десенсибилизаторы, дезинфектанты, вяжущие вещества, силанты, антисептики с содержанием ЭДТА, пероксид водорода и т.п. (за исключением хлоргексидиновых растворов). Остатки этих веществ могут оказать негативное воздействие на прочность соединения и краевую полимеризацию адгезива, в особенности материалов химического и двойного отверждения.

Непрепарированная зубная эмаль
- Очистите, как обычно, зубную эмаль (например, с помощью полировочной пасты или струйной очистки порошком) и тщательно промойте ее спреем воды.
- Затем осуществите протравливание и промывку (см. раздел «Избирательное протравливание эмали»).
- Затем продолжите нанесение адгезива Single Bond Universal.

Протравливание твердых тканей зуба (опционально)
Соответствующая клиническим требованиям сила адгезии обеспечивается простым нанесением данного адгезива. Однако можно достичь больших силы адгезии, применяя избирательное протравливание эмали или, воспользовавшись «процедурой тотального протравливания».

Избирательное протравливание эмали
Случайное протравливание дентина не оказывает какого бы то ни было отрицательного воздействия на адгезию.
- Нанесите обычно используемый, состоящий из фосфорной кислоты (около 35%) протравочный гель (например, протравочный гель Scotchbond Universal Etchant) на подготовленную или непрепарированную (если таковая присутствует) зубную эмаль (эмаль или дентин) и дайте прореагировать в течение 15 сек.
- Тщательно промойте водой и не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами; не пересушивайте.

Процедура тотального протравливания
- Нанесите обычно используемый, состоящий из фосфорной кислоты (около 35%) протравочный гель (например, протравочный гель Scotchbond Universal Etchant) на подготовленную или непрепарированную (если таковая присутствует) структуру зуба (эмаль или дентин) и дайте прореагировать в течение 15 сек.
- Тщательно промойте водой и не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами; не пересушивайте.

Порядок действий для фиксации прямых реставраций с применением светоотверждаемых композитных и компомерных материалов, интраоральной починки реставраций из светоотверждаемых композитных материалов, десенсибилизации поверхности корня, силанизации полостей перед заполнением амальгамой, обработки полостей и восстановленных культей перед временным присоединением непрямых реставраций
- Воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения адгезива на всю структуру зуба и **втирайте его** в течение 20 сек. Избегайте контакта между адгезивом и слизистой оболочкой полости рта.
- При необходимости, повторно увлажните одноразовый аппликатор во время обработки.
- Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
- Осуществите отверждение адгезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
- Для фиксации штифта воспользуйтесь материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Порядок действий при работе с композитными материалами химического отверждения и композитными материалами двойного отверждения, а также материалами для восстановления культи и цементами
В случае использования RelyX Ultimate активатор не нужен, так как он уже присутствует в цементе. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.
- Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в плетеру для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
- Воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения смеси на всю структуру зуба и **втирайте ее** в течение 20 сек. Избегайте контакта между адгезивом и слизистой оболочкой полости рта.
- При необходимости, повторно увлажните одноразовый аппликатор во время обработки.
- Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
- Осуществите отверждение адгезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
- Согласно показаниям продолжите работу с требуемым материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Порядок действий при цементировании непрямых реставраций и виниров с применением адгезивного композитного цемента RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement
- При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.

Использование Single Bond Universal в качестве покрытия для непрямых реставраций
При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.
- Подготовьте поверхность реставрации:
  – Протравите стеклокерамические поверхности плавиковой кислотой в соответствии с инструкцией производителя.
  – Придайте шероховатость композитам, диоксидциркониевым керамическим и металлическим поверхностям предпочтительно с помощью пескоструйной обработки.
  – Не протравливайте фосфорной кислотой, так как это может ослабить соединение к определенным материалам (например, цирконию, оксиду алюминия, металлам).
- Тщательно промойте поверхность водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
- В сочетании с другими композитными цементами:
  – Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в плетеру для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
  – Сразу же после смешивания воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения адгезива по всей поверхности цементируемой реставрации и дайте **прореагировать** в течение 20 сек. Не осуществляйте светоотверждение.
  – Для нанесения цемента следуйте инструкции по его применению.

Использование RelyX Ultimate для фиксации штифтов
При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.

Использование других композитных цементов для фиксации штифтов
- Подготовьте эндодонтически обработанный корневой канал для фиксации штифта.
- Проверьте посадку штифта; он должен входить на 2/3 длины корневого канала.
- Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
- Воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения смеси на всю структуру зуба и **втирайте ее** в течение 20 сек.
- Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель. Абсорбируйте излишки жидкости бумажным штифтом.
- Осуществите отверждение адгезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
- Для фиксации штифта воспользуйтесь материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Порядок действий при фиксации виниров с использованием цемента для виниров RelyX™ Veneer Cement
- Поверхность фиксируемого стеклокерамического винира должна быть протравлена плавиковой кислотой в соответствии с инструкцией производителя. При использовании Single Bond Universal дополнительного силанового покрытия не требуется.
- Перед нанесением адгезива очистите подготовленную структуру зуба пемзовой пастой, тщательно промойте водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами. Проверьте посадку винира с помощью пасты RelyX™ Try-In. Используйте воду для смывания пасты с зуба и винира и высушите все поверхности не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами. Проверьте посадку винира с помощью пасты RelyX™ Try-In. Используйте воду для смывания пасты с зуба и винира и высушите все поверхности не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами. С помощью прозрачных матричных полосок изолируйте соседние зубы от области препарирования под виниры.
- Нанесите обычно используемый, состоящий из фосфорной кислоты (около 35%) протравочный гель (например, протравочный гель Scotchbond Universal Etchant) на эмаль и дентин и дайте прореагировать в течение 15 сек. Смойте гель струей воды и высушите водой в течение 10 секунд и высушите ватными тампонами. Поверхность должна быть блестящей и без остатков воды.
- Незамедлительно нанесите с помощью одноразовым аппликатором для нанесения Single Bond Universal на всю внутреннюю эмаль и дентина **втирайте его** в течение 20 сек. Избегайте контакта между адгезивом и слизистой оболочкой полости рта. При необходимости, повторно увлажните одноразовый аппликатор во время обработки. Распределите адгезив по всей внутренней эмали и дентина **втирайте его** в течение 20 сек. Избегайте контакта между адгезивом и слизистой оболочкой полости рта. При необходимости, повторно увлажните одноразовый аппликатор во время обработки. Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель. Осуществите отверждение адгезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации. Согласно показаниям продолжите работу с требуемым материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Порядок действий при цементировании непрямых реставраций и виниров с применением адгезивного композитного цемента RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement
- При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.

Использование Single Bond Universal в качестве покрытия для непрямых реставраций
При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.
- Подготовьте поверхность реставрации:
  – Протравите стеклокерамические поверхности плавиковой кислотой в соответствии с инструкцией производителя.
  – Придайте шероховатость композитам, диоксидциркониевым керамическим и металлическим поверхностям предпочтительно с помощью пескоструйной обработки.
  – Не протравливайте фосфорной кислотой, так как это может ослабить соединение к определенным материалам (например, цирконию, оксиду алюминия, металлам).
- Тщательно промойте поверхность водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
- В сочетании с другими композитными цементами:
  – Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
  – Сразу же после смешивания воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения адгезива по всей поверхности цементируемой реставрации и дайте **прореагировать** в течение 20 сек. Не осуществляйте светоотверждение.
  – Для нанесения цемента следуйте инструкции по его применению.

Использование RelyX Ultimate для фиксации штифтов
При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.

Использование других композитных цементов для фиксации штифтов
- Подготовьте эндодонтически обработанный корневой канал для фиксации штифта.
- Проверьте посадку штифта; он должен входить на 2/3 длины корневого канала.
- Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
- Воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения смеси на всю структуру зуба и **втирайте ее** в течение 20 сек.
- Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель. Абсорбируйте излишки жидкости бумажным штифтом.
- Осуществите отверждение адгезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
- Для фиксации штифта воспользуйтесь материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Десенсибилизация поверхности корня
- Очистите, как обычно, поверхность корня (например, с помощью полировочной пасты или струйной очистки порошком).
- Тщательно очистите распыленным водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
- Затем продолжите нанесение адгезива Single Bond Universal.

Предварительная обработка пломб или реставраций в процессе починки
(реставрации из композитных материалов, стеклокерамики, диоксидциркониевой керамики, керамики на основе оксида алюминия, металла (включая амальгаму))
- Тщательно шероховатость поверхности реставрации (предпочтительно пескоструйной очисткой оксидом алюминия ≤40 мкм); если Вы работаете с керамикой, следует, снять глазурь до 1 мм над краем.
- Тщательно очистите распыленным водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
  – Не протравливайте фосфорной кислотой, так как это может ослабить адгезию к определенным материалам (например, цирконию, оксиду алюминия, металлу).
- Затем незамедлительно продолжите нанесение адгезива Single Bond Universal. В использовании дополнительного слоя нет необходимости.

Дозирование адгезива

Дозирование из флакона
У колпачка дозирующего флакона имеется выемка для большого пальца руки, что позволяет открыть его с одной стороны и снова закрыть одной рукой. Колпачок остается открытым, если угол раскрытия >90°.
- Чтобы открыть флакон, возьмите его в руку, поместите большой палец руки в выемку для большого пальца и откройте крышку, надавив на колпачок в сторону, пока он не останется в открытом положении.
- Держите флакон вверх дном в вертикальном положении и налейте требуемое количество Single Bond Universal в палитру для смешивания. Защищайте находящийся в палетке для смешивания адгезив от попадания света.
- После использования аккуратно закройте флакон, приложив давление к рычагу сверху.
  – При нажатии колпачок ощутимо защелкнется на своем месте и вокруг между колпачком и флаконом будет виден небольшой равномерный зазор.

Дозирование из блистера L-Pop
Внимание: Не сдавливайте блистер L-Pop без одноразового аппликатора.
- Держите стержень одноразового аппликатора одной рукой, закрывая отверстие блистера своим большим пальцем. Это предотвратит разбрызгивание жидкости для протравливания.
- С помощью большого и указательного пальцев другой руки сожмите емкость блистера L-Pop, начиная с наружного конца, в направлении одноразового аппликатора.
- Проверните одноразовый аппликатор туда-обратно, чтобы обеспечить полное покрытие.
- Для облегчения применения в полости одноразовый аппликатор может быть согнут, все еще находясь в блистере L-Pop. Для этого необходимо вытащить одноразовый аппликатор из блистера настолько, чтобы можно было увидеть стержень аппликатора. Согните стержень аппликатора в этом месте поверх ногтя вашего большого пальца.
- Во время обработки для повторного увлажнения аппликатора выдавливайте всю жидкость большим и указательным пальцами в открытый конец вдавливания.

Дозирование активатора
- Откройте крышку флакона.
- Смешайте в палетке для смешивания требуемое количество Single Bond Universal DCA в пропорции 1:1 (капли) с Single Bond Universal и смешайте в течение 5 сек. непосредственно перед нанесением. Защищайте находящуюся в палетке для смешивания жидкость от попадания света.
- Плотно и аккуратно закройте флакон после дозирования. Если необходимо, дезинфицируйте флакон в соответствии с местными нормами гигиены.

Применение
- Во время нанесения избегайте любого загрязнения кровью, слюной или десневой жидкостью. Для обеспечения достаточной сухости обрабатываемой области и предотвращения воздействия на мягкие ткани мы рекомендуем использовать коффердам.

Порядок действий для фиксации прямых реставраций с применением светоотверждаемых композитных и компомерных материалов, интраоральной починки реставраций из светоотверждаемых композитных материалов, десенсибилизации поверхности корня, силанизации полостей перед заполнением амальгамой, обработки полостей и восстановленных культей перед временным присоединением непрямых реставраций
- Воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения адгезива на всю структуру зуба и **втирайте его** в течение 20 сек. Избегайте контакта между адгезивом и слизистой оболочкой полости рта.
- При необходимости, повторно увлажните одноразовый аппликатор во время обработки.
- Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
- Осуществите отверждение адгезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
- Согласно показаниям продолжите работу с требуемым материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Порядок действий при цементировании непрямых реставраций и виниров с применением адгезивного композитного цемента RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement
- При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.

Использование Single Bond Universal в качестве покрытия для непрямых реставраций
При использовании RelyX Ultimate вещество Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению RelyX Ultimate.
- Подготовьте поверхность реставрации:
  – Протравите стеклокерамические поверхности плавиковой кислотой в соответствии с инструкцией производителя.
  – Придайте шероховатость композитам, диоксидциркониевым керамическим и металлическим поверхностям предпочтительно с помощью пескоструйной обработки.
  – Не протравливайте фосфорной кислотой, так как это может ослабить соединение к определенным материалам (например, цирконию, оксиду алюминия, металлам).
- Тщательно промойте поверхность водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
- В сочетании с другими композитными цементами:
  – Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
  – Сразу же после смешивания воспользуйтесь одноразовым аппликатором для нанесения адгезива по всей поверхности цементируемой реставрации и дайте **прореагировать** в течение 20 сек. Не осу